

# Kolorektální karcinom

Postihuje nejčastěji osoby starší 50 let. V České republice se jedná o druhý nejčastější nádor u mužů i u žen<sup>1,2</sup>.


**Rakovina nepatří do pozadí, nechte se vyšetřit!**

## Rizikové faktory



Většinou toto onemocnění vzniká ve věku nad 50 let, výjimkou ale nejsou ani mladší pacienti<sup>1</sup>.

### Věk nad 50 let



### Životní styl<sup>1</sup>



Některé dědičné genové mutace jsou spojeny s vyšším rizikem kolorektálního karcinomu, např. familiární adenomatózní polypóza<sup>1</sup>.

### Genetika

## Jak vznikne kolorektální karcinom


Většina případů kolorektálního karcinomu začíná jako polyp, tedy malý výrůstek v tkáni, která vystylá tlusté střevo nebo konečník. Některé polypy se mohou přeměnit v nádorové, začít růst a nakonec se rozšířit i do dalších částí těla<sup>1</sup>.




## Příznaky

V časných stádiích onemocnění jsou často potíže nevyrazné. Pozornost je třeba věnovat každé dlouhodobější změně střevní činnosti, která se projevuje průjemem, zácpou, pocitem nedokonalého vyprázdnění nebo obtížným vyprazdňováním<sup>1</sup>.

**Příznaky, na které si dávat pozor:**



## Léčba<sup>1</sup>



## Reference

1. O nádorech tlustého střeva a konečníku. Linkos.cz. Dostupné na <http://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-travici-trubice-jicen-zaludek-tenke-strevo-tluste-strevo-konecnik-rit-c15/o-nadorech-tlusteho-streva-a-konecniku> (Naposledy navštíveno 27. 2. 2019).
2. Incidence kolorektálního karcinomu v Evropě. Kolorektum.cz. Dostupné na <http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-verejnost&aid=488> (naposledy navštíveno 5. 3. 2019).
3. Rakovina tlustého střeva a konečníku. Kolorektum.cz. Dostupné na <http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-verejnost--kolorektalni-karcinom> (naposledy navštíveno 5. 3. 2019).

**Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice neustále roste<sup>3</sup>.**

**Ročně se v ČR vyskytne téměř 8000 nových případů nádoru tlustého střeva a konečníku a polovina pacientů na tuto diagnózu zemře<sup>3</sup>.**

**Jedná se o druhý nejčastější nádor v ČR u mužů i u žen<sup>1</sup>.**